



Número de animais com diagnóstico laboratorial de raiva de 01/01/2018 a 07/03/2018




Número de animais com diagnóstico laboratorial de raiva de 01/01/2019 a 07/03/2019



## Prevalência da raiva animal no Rio Grande do Norte em 2019\*

Município	Número de casos	Animal acometido
Macaíba	3	Morcegos
Nova Cruz	1	Morcego
Parnamirim	1	Morcego
Santo Antônio	1	Morcego
João Câmara	1	Boi
Caicó	2	Morcegos

\*Municípios listados por ordem cronológica do primeiro registro



- 1 – Macaíba
- 2 – Nova Cruz
- 3 – Parnamirim
- 4 – Santo Antônio
- 5 – João Câmara
- 6 – Caicó

**Total de 9 animais: 8 morcegos (88,9%) e 1 boi**

# É fácil identificar um morcego suspeito de raiva!



Morcego encontrado caído no chão ou encontrado morto



Morcego pousado em local desprotegido durante o dia



Morcego voando durante o dia




Morcego alimentando-se durante o dia


## O que fazer ao encontrar morcego suspeito de raiva?

- ✓ Não toque no animal
- ✓ Afaste pessoas e animais do local
- ✓ Coloque uma caixa, balde ou pano em cima do morcego
- ✓ Entre em contato com o Controle de Endemias ou com o Centro de Controle de Zoonoses da sua cidade e solicite a remoção do animal


# Recomendações para prevenção da raiva




Em todo caso de mordedura e/ou arranhadura com animal que pode transmitir raiva, lave a lesão com água corrente e sabão e procure assistência médica imediatamente




Na situação em que morcego adentrou um local e existe dúvida se ocorreu contato com o animal, também é preciso buscar assistência médica



Caso encontre morcego durante o dia (vivo ou morto), não toque no animal, coloque algo cobrindo-o e informe à Secretaria Municipal de Saúde para que seja feito recolhimento do morcego



Cães ou gatos que forem encontrados com morcegos devem ficar em isolamento por 180 dias e devem receber duas ou três doses de vacina antirrábica dependendo do estado imunológico do animal



A vacinação anual contra raiva em cães, gatos, bois, cavalos, porcos, bodes, carneiros e asnos é uma das principais medidas para prevenção da raiva